

ΑΡΘΡΟΔΕΣΗ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟΔΕΣΗ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗΣ

Υπαστραγαλική είναι η άρθρωση 'κάτω από τον αστράγαλο', δηλαδή μεταξύ αστραγάλου και πτέρνας.

Συνήθως η αρθρίτιδα είναι αποτέλεσμα τραυματισμού (πχ. μετά από κάταγμα πτέρνας, ή σε χρόνια συνδεσμική αστάθεια), ή παραμόρφωσης (πχ. σε περιπτώσεις ανεπάρκειας οπισθίου κνημιαίου τένοντα και βλαισοπλατυποδίας).

Η αρθρόδεση γίνεται χρησιμοποιώντας βίδες και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει αρθροσκοπικά.



Μετεγχειρητικά χρησιμοποιείται γύψος και χρειάζονται πατερίτσες. Υπάρχουν περιορισμοί σε ότι αφορά τη φόρτιση του ποδιού για περίπου τρεις μήνες. Τα ποσοστά επιτυχίας κυμαίνονται περί το 90%. Οι επιπλοκές, όπως η μη πώρωση της αρθρόδεσης είναι συχνότερες στους καπνιστές.

Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς - Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.

Εξειδίκευση στη Χειρουργική Ποδιού-Ποδοκνημικής-Γόνατος-Αθλητικές Κακώσεις στη
Μεγ.Βρετανία

Consultant Orthopaedic Foot & Ankle Surgeon, UK

Email: gougnik@yahoo.com

Web: www.footsurgery.gr